## NICHOIR



éf : NI0021 - Ja

## SEMI-OUVERT



Le nichoir semi-ouvert peut accueillir des oiseaux semi-cavernicoles, c'est-à-dire des oiseaux établissant leur nid au sein d'espaces qui reçoivent beaucoup de lumière. Ce nichoir spacieux convient ainsi parfaitement au Rouge-gorge, au Troglodyte, au Rougequeue noir, à la Bergeronnette grise, au Gobemouche gris, et parfois même au Merle noir. Son caractère assez brut est voulu pour garder au maximum l'aspect naturel.

## **INSTRUCTIONS**

Le Merle et le Rouge-gorge établissent leur nid dans des ligneux touffus, comme dans des haies, bosquets, parcs et jardins, lisières et clairières forestières, par exemple. Celui du Rougequeue dans des cavités naturelles ou artificielles protégées par un surplomb. Celui du Troglodyte est souvent accroché dans le lierre le long d'un mur, d'un rocher, d'un tronc, ou dans un entrelacs de racines d'une berge érodée de cours d'eau ou d'une souche d'arbre déraciné par le vent, ou encore dans une cavité de rocher. Enfin, celui du Merle se trouve généralement dans des ligneux touffus, comme dans des haies, bosquets, parcs et jardins, lisières et clairières forestières.

HAUTEUR: 1 à 10 m du sol pour le Merle, 2 à 6 m pour le Rougequeue, 0 à 4 m pour le Troglodyte et 1 m50 environ pour le Rouge-gorge.

**ORIENTATION:** une orientation, de préférence vers l'est ou vers le sud-est à l'abri des vents dominants et penché un peu vers l'avant permettant une protection de la pluie.

PÉRIODE IDÉALE POUR METTRE LE NICHOIR : en automne ou à la fin de l'hiver.

**FAUT-IL ENLEVER LE NICHOIR PENDANT LES SAISONS FROIDES:** une fois installé, un nichoir en béton de bois peut être laissé en permanence, y compris pendant les saisons froides (automne-hiver). Les oiseaux s'en serviront éventuellement comme abri face au froid ou comme protection des prédateurs. N'oubliez pas cependant de le nettoyer 1 fois par an (voir ci-après). Pour un nichoir en bois, vous pouvez l'enlever ou le laisser, c'est au choix! Si vous le laissez, vérifiez cependant son état, n'hésitez pas, si nécessaire, à changer une planche abîmée (le toit par exemple), à le traiter avec de l'huile de lin pour le protéger et à le vider s'il y a eu un nid.

**COMMENT LE FIXER:** Si vous le fixez sur le tronc d'un arbre, placez un bout de bois ou de mousse entre le tronc et le fil de fer pour éviter de blesser l'arbre. Il ne faut pas utiliser de clous, sauf pour les nichoirs fournis avec un clou spécifique en aluminium. Pour le Rougequeue, le nichoir peut aussi être placé sur une façade d'un bâtiment, de préférence sous une avancée de toit. Pour le Troglodyte, il doit être suspendu idéalement au plus près du sol, dans une zone broussailleuse, une haie touffue ou encore un lieu ombragé.

QUELLE DISTANCE ENTRE DEUX NICHOIRS: si vous installez plusieurs types de nichoirs pour différentes espèces, veillez à ce que chaque nichoir soit espacé de 4 mètres au minimum.

**QUELLE QUANTITÉ DE NICHOIRS INSTALLER:** en fonction de l'espace à votre disposition et des ressources alimentaires locales. La pose de six à huit nichoirs par hectare semble être suffisante.

**COMMENT PROTÉGER LE NICHOIR DES PRÉDATEURS :** fixation en hauteur. Un ruban de ronces peut être mis en place également. D'autres systèmes de protection existent et sont disponibles à notre Boutique Nature.

**INFOS COMPLÉMENTAIRES:** afin d'attirer les oiseaux semi-cavernicoles, faites en sorte que votre jardin réponde aux besoins de ceux-ci. Ainsi, veillez à planter des arbres, arbustes et plantes grimpantes à baies et à fruits comme l'aubépine, le lierre, le houx, le sorbier des oiseleurs, le chèvrefeuille, le sureau ou encore le berbéris. Pensez aussi à installer un point d'eau en toute saison. Évitez l'utilisation de pesticides, désherbants, insecticides, herbicides ou tout autre produit d'origine chimique. Ces oiseaux étant majoritairement insectivores, notamment durant la période printanière et estivale, la présence d'insectes est particulièrement importante pour eux. Un jardin « bien entretenu » (herbe tondue, fleurs fanées coupées, mauvaises herbes éliminées...) n'abritera pas une grande variété d'insectes. Il est donc recommandé de laisser les fleurs monter en graines, les plantes se ressemer naturellement, de conserver des zones d'herbe fauchée et non tondue ainsi que de planter des arbustes feuillus.

**ENTRETIEN :** une vérification annuelle en septembre - octobre est recommandée afin d'éviter la propagation de maladies et la présence de parasites. Vous pouvez vider complètement le nichoir et, en cas de présence de parasites, désinfectez avec de l'essence de thym ou de serpolet. Enfin, n'oubliez pas de vérifier la fixation du nichoir.



RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS PRODUITS SUR

www.protectiondesoiseaux.be

